

Complex Intensivo

Vacuna Octavalente Combinada para Bovinos



Protege contra Complejo Respiratorio Bovino
y Queratoconjuntivitis Infecciosa

**Feedlot, Engordes intensivos, Destete Precoz,
Rodeos con Suplementación a Campo,
Vaquillonas de Reposición, Rodeos de Cría
en Pastoreo Racional Intensivo.**

Complex Intensivo



Vacuna Octavalente Combinada para Bovinos

Ventajas

- **Protege contra Patologías que normalmente afectan los rodeos en producción intensiva. Complejo Respiratorio Bovino y Queratoconjuntivitis infecciosa.**
- **Especialmente indicada en: Feedlot, Engordes intensivos, Destete Precoz, Rodeos con Suplementación a Campo, Vaquillonas de Reposición, Rodeos de Cría en Pastoreo Racional Intensivo.**
- **Contiene cepas de IBR, DVB, PI3, VRSB, Pasteurella Multocida, Haemolytica, Haemophilus Somnus y Moraxella Bovis en alta concentración antigénica.**

Indicaciones

Prevención y control de todas las patologías infecciosas donde actúe alguna de las cepas bacterianas o virales constituyentes de la fórmula.

Dosis

5 ml. Vía subcutánea.

Terneros: a partir de los 3 meses de edad, aplicar 2 dosis con intervalo de 21 días. Revacunación anual.

Bovinos adultos: primo vacunados aplicar 2 dosis con intervalo de 21 días. Revacunación anual.

Hembras preñadas: aplicar 2 dosis con 21 días de intervalo en el último tercio de la gestación. Revacunación anual.

Presentación

Frasco conteniendo 250 ml, equivalente a 50 ds.

Fórmula

Suspensión inactivada de los virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Viral Bovina (DVB), Parainfluenza Bovina tipo 3 y Virus Respiratorio Sincicial Bovino (VRSB). Suspensión inactivada de Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Haemophilus somnus y Moraxella bovis. Saponinada y gel de hidróxido de aluminio como adyuvantes.

Instrucciones

Para lograr una buena inmunidad, se recomienda evitar tratamientos paralelos ó manejos de campo (arrees, embarques, baños, etc.) desde 48 hs. antes y hasta 72hs. posteriores a la vacunación.

En caso de reacción anafiláctica, aplicar epinefrina.

