

Florfarma 30

Antibiótico de amplio espectro



Complejo respiratorio bovino

Queratoconjuntivitis,
Pietin, Diarreas

**Mayor eficacia en casos
de Haemophilus**

Florfarma 30

Ventajas

• ALTA EFECTIVIDAD

Actúa contra las bacterias patógenas más comúnmente implicadas en la Enfermedad Respiratoria Bovina. Ha demostrado alta eficiencia contra cepas de Haemophilus resistentes a la Tilmicosina. Activo contra Bacteroides nodosus y Bacteroides meningogenicus, productores del Pietin.

• EFICACIA

Con una dosis se alcanzan altas concentraciones terapéuticas, larga vida media en suero, tejido pulmonar, secreciones bronquiales, etc. y excelente penetración y persistencia en el sitio de la infección.

• RAPIDEZ DE ACCIÓN

Posee una alta solubilidad lipídica, lo que explica su excelente y rápida distribución en tejidos, grasas y fluidos corporales logrando reducir con rapidez los signos de enfermedad, evitando la pérdida de peso corporal.

• SEGURIDAD

No provoca resistencia. Interfiere la síntesis de la proteína bacteriana uniéndose a sus ribosomas, inhibiendo la peptidil transferasa y elimina completamente la infección bacteriana.



Florfarma 30 es un antibiótico de amplio espectro en solución inyectable, formulado en base a Florfenicol en concentración de 300 mg/ml.

El florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro análogo del fluorinado del Tiafenicol y Cloranfenicol, activo contra más de 25 tipos de bacterias causantes de la Enfermedad Respiratoria Bovina, con altos niveles de seguridad en Pasteurellas y Haemophilus somnus.

Antibiótico de amplio espectro Inyectable

Indicaciones

Indicado para combatir enfermedades de los Bovinos, causadas por bacterias sensibles al Florefenicol. Tratamiento de enfermedades Respiratorias. Diarreas de los terneros. Pletin. Queratoconjuntivitis. Infecciones del tracto genital e infecciones en general.

Restricciones de uso

No sacrificar animales productores de carne para consumo humano hasta transcurridos 28 días de la aplicación del último tratamiento. No utilizar en animales productores de leche para consumo humano.

Contraindicaciones

No administrar en toros adultos destinados a la reproducción.

Presentación

Frasco ampolla conteniendo 20 ml y 100 ml.

Dosis y vías de administración

Aplicar en Bovinos.

Dosis 20 mg/kg de peso vivo (1 ml cada 15 kg p.v.). Se debe aplicar una segunda dosis con intervalo de 48 horas.

PESO (k.p.v)	VOLUMEN (ml)	PESO (k.p.v)	VOLUMEN (ml)
15	1	90	6
30	2	150	10
45	3	300	20
60	4	400	26,70
75	5	500	33,33

Aplicar vía intramuscular en la tabla del cuello del animal. No aplicar más de 20 ml por cada punto de inyección. Puede observarse una disminución del consumo alimentario durante el tratamiento, desapareciendo una vez terminado el mismo. En caso de sobre dosificación se puede observar ablandamiento de heces, síntoma que desaparece al suspender el tratamiento.





www.agropharma.net